

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Es doloroso el procedimiento ClosureFast™?

R: La mayoría de los pacientes dice sentir un dolor leve, o nada de dolor, durante el procedimiento ClosureFast.¹ Su médico debería administrarle anestesia local o regional para adormecer la zona que se va a tratar.

P: ¿Cuán pronto puedo retornar a mis actividades normales?

R: Los pacientes tratados con el procedimiento ClosureFast pueden retomar sus actividades normales más rápidamente que los pacientes que se someten a la extirpación quirúrgica de venas o a la ablación endovenosa. En general, tras recibir el procedimiento ClosureFast, el paciente promedio retoma sus actividades normales al cabo de unos pocos días.² Posiblemente, su médico especialista en venas le recomiende que, durante algunas semanas después del tratamiento, camine de manera regular y se abstenga de realizar actividades muy agotadoras (como levantar objetos pesados) y de permanecer de pie durante periodos prolongados.

P: ¿Queda alguna cicatriz, algún hematoma o inflamación después del procedimiento?

R: La mayoría de los pacientes dicen tener cicatrices, hematomas o inflamación mínimos o inexistentes después del procedimiento ClosureFast™.¹

P: ¿Cuán pronto después del tratamiento mejorarán mis síntomas?

R: La mayoría de los pacientes informan de una mejoría evidente de sus síntomas en el término de 1 a 2 semanas después del procedimiento.¹

P: ¿En qué se diferencia el procedimiento ClosureFast del láser endovenoso?

R: Tanto el procedimiento ClosureFast y la ablación endovenosa con láser de 980 nm son procedimientos mínimamente invasivos; no obstante, un estudio multicéntrico comparativo demostró que el procedimiento ClosureFast se asoció con tasas estadísticamente significativas más bajas de dolor, hematomas y complicaciones. Además, los pacientes que se sometieron al procedimiento ClosureFast informaron mejoras en la calidad de vida hasta cuatro veces más rápido que aquellos tratados con ablación endovenosa con láser de 980 nm.¹

P: ¿En qué se diferencia el procedimiento ClosureFast de la extirpación de venas?

Durante la extirpación de venas, se realizan incisiones en la ingle y la pantorrilla, y se inserta una herramienta a través de la vena enferma para extraerla de la pierna. Con el procedimiento ClosureFast, se realiza solo una pequeña incisión en el lugar de inserción y luego la vena se trata y se deja en su lugar. Este enfoque mínimamente invasivo disminuye la probabilidad de que se produzcan el dolor y los hematomas relacionados con la extirpación de venas.^{4,5}

P: ¿El seguro cubre el procedimiento ClosureFast?

Muchas compañías de seguros pagan el procedimiento ClosureFast en forma parcial o total. El procedimiento ClosureFast tiene pólizas de cobertura en las principales compañías de seguros de salud. Antes de buscar tratamiento, infórmese sobre la cobertura con su proveedor de seguros.

EXPERIMENTA MOLESTIA A CAUSA DE VENAS VARICOSAS?

Si es así, es posible que padezca de insuficiencia venosa crónica. Más de 190 millones de personas en el mundo padecen de venas varicosas o insuficiencia venosa crónica (IVC). La gran mayoría permanecen sin diagnosticarse y sin tratarse.^{1,2} Sin tratamiento, las personas con la enfermedad pueden experimentar síntomas progresivos, tales como hinchazón de las piernas, daños en la piel y / o úlceras que pueden ser debilitantes e impactar significativamente su calidad de vida.

Afortunadamente, el diagnóstico y tratamiento precoces de esta enfermedad pueden detener su avance.



Sistema ClosureFast™



TEGUCIGALPA

Tienda Principal

Col. Rubén Darío, # 2117 detrás del Campo Scout
Horario de lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Horario de sábado: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Tel: +(504) 2232-3544/ 2232-2503/ 9441-2170

Tienda Suyapa

Fte. Materno Infantil
Horario de lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Horario de sábado: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Tel: +(504) 2235-4923/ 7216-9065/ 3397-8785/ 3182-6963

Tienda Honduras Medical Center

1er. nivel, contiguo a entrada principal
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Horario de sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tel: +(504) 2280-1241/ 9457-9950

Tienda City Mall Tegucigalpa

1er. nivel, al par de Time Out
Horario de lunes a sábado: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Horario de domingo: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tel: +(504) 9456-1143

CHOLUTECA

Tienda Choluteca

Ave. Vicente Williams, 3ra. Calle N.E.
Horario de lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario de sábado: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tel: +(504) 2780-4064/ 3397-8743

Tienda Unimall Choluteca

Centro Comercial Unimall
Horario de lunes a sábado: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Horario de domingo: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tel: +(504) 3378-2329

DANLÍ

Tienda Uniplaza Danlí

Centro Comercial Uniplaza
Horario de lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Horario de sábado: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tel: +(504) 9600-2255/ 9328-5236

SAN PEDRO SULA

Tienda Las Acacias

Bo. Las Acacias, 7 ave., 12 calle N.O., frente al Instituto Tridentino
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario de sábado: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tel: +(504) 2552-4290/ 2553-5004/ 9453-2393

Tienda Bermejo

Sector Bermejo, contiguo a gasolinera Uno, Boulevard del Norte
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Horario de sábado: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Horario de domingo: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tel: +(504) 2566-0200/ 2566-0199/ 3370-3276

COMAYAGUA

Tienda Comayagua

En Centro Comercial Metroplaza
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Horario de sábado: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tel: +(504) 9613-0511

LA CEIBA

Tienda La Ceiba


Edificio Frazier, Ave. Morazón, cuadra y media antes del Hospital D'Antoni
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario de sábado: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tel: +(504) 2443-0060/ 3370-2046

OLANCHO

Tienda Juticalpa

En Centro Médico Olancho salida a Catacamas
Horario de lunes a viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Horario de sábado: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Tel: +(504) 3370-0061/ 2785-2906/ 8875-2229

ENCUENTRE ALIVIO PARA VENAS VARICOSAS



Procedimiento ClosureFast™

MEY-KO | Medtronic

Medtronic
Juntos, más lejos

MEY-KO

ANATOMIA DEL SISTEMA VENOSO

ENTENDIENDO LA ENFERMEDAD POR REFLUJO VENOSO


EXPERIMENTE EL PROCEDIMIENTO CLOSUREFAST

LOS RESULTADOS CUENTAN

El sistema venoso está formado por una red de venas, que incluye:


- **Venas superficiales:** venas situadas cerca de la superficie de la piel.
- **Venas profundas:** venas más grandes situadas en la parte profunda de la pierna
- **Venas perforantes:** venas que conectan las venas superficiales con las venas profundas

El procedimiento ClosureFast™ trata el reflujo venoso en el sistema venoso superficial, que suele ser la causa subyacente del dolor debido a la presencia de venas varicosas.




Las venas saludables en las piernas tienen válvulas que mantienen el flujo de la sangre hacia el corazón. La enfermedad por reflujo venoso superficial se desarrolla cuando las válvulas dejan de funcionar de manera apropiada y permiten que la sangre fluya de vuelta (es decir, reflujo) y se acumule en las venas inferiores de la pierna. La enfermedad por reflujo venoso puede causar, los siguientes síntomas en las piernas:¹

- Venas Varicosas
- Hinchazón en la pierna o tobillo
- Pesadez o cansancio
- Dolor o calambres
- Ardor o picazón de la piel
- Alteraciones de la piel o erupciones cutáneas
- Úlceras o heridas abiertas



VALVULA VENOSA SANA
Las válvulas sanas aseguran el flujo de la sangre en una sola dirección.



VALVULA VENOSA PATOLÓGICA
Las válvulas patológicas hacen que la sangre fluya en ambas direcciones, lo que hace que aumente la presión venosa

La enfermedad por reflujo venoso es una condición médica progresiva que si no se trata puede empeorar con el tiempo y convertirse en una forma más grave de la enfermedad venosa llamada insuficiencia venosa crónica (CVI).³



Fotos cortesía de of Rajabrata Sarkar, MD, PhD

El procedimiento ClosureFast se puede llevar a cabo de forma ambulatoria u hospitalizada. Mediante una ecografía, su médico colocará el catéter ClosureFast™ dentro de la vena enferma a través de una pequeña incisión en la piel. El pequeño catéter activado por energía de radiofrecuencia (RF) calienta la pared de la vena. A medida que la energía térmica se administra, la pared de la vena se contrae y la vena se sella. Cuando la vena enferma se cierra, la sangre se desvía hacia otras venas sanas.



Después del procedimiento, se coloca un vendaje simple sobre el sitio de inserción, y puede proporcionarse compresión adicional para contribuir a la curación. Su médico puede alentarle a caminar y a evitar permanecer de pie durante períodos prolongados y realizar actividades extenuantes durante un tiempo. En general, el paciente promedio retoma sus actividades normales al cabo de unos pocos días.⁵

SUFRE DE REFLUJO VENOSO?

Existen muchos factores que contribuyen a la presencia de reflujo venoso, que incluyen:⁸

- Edad
- Sexo
- Historia Familiar
- Levantamiento de objetos pesados
- Embarazos Múltiples
- Obesidad
- Profesión que requiere estar de pie

Su médico usará ultrasonido para escanear su(s) pierna(s) y determinará la presencia de reflujo venoso.

Los estudios han demostrado:

- **Alivio** de los síntomas al cabo de dos días⁴
- **Menos dolor que el láser endovenoso** - un procedimiento ambulatorio o quirúrgico con anestesia local⁴
- **Resultados comprobados** con experiencia y evolución positiva para el paciente.^{4,9}
- **Rápida Recuperación** - El paciente promedio generalmente retoma sus actividades normales en el término de unos pocos días⁵

Antes del Tratamiento




Después del Tratamiento*



* Los resultados individuales pueden variar.

Foto cortesía de Vein Institute of the North Shore, Beverly, MA

Vea lo que el procedimiento ClosureFast puede hacer por usted.



Las venas perforantes conectan el sistema venoso profundo con el superficial